



S'INFORMER

H5N1

Nom de code d'un espion ?

Presque....

En tout cas, un tout petit, et teigneux !



MORALITÉ :

EN MATIÈRE DE COEFFICIENT D'AGRESSIVITÉ
CE N'EST PAS LA TAILLE QUI COMPTE.
MÉFIANCE, PLUS C'EST PETIT PLUS C'EST TEIGNEUX



Une "hécatombe" de grues
cendrées dans la Nièvre,
"certains oiseaux tombent
même en plein vol"

Eh oui, H5N1 est un des virus de **l'influenza aviaire** :
maladie **animale très contagieuse**,
pour les oiseaux sauvages,
de compagnie, des parcs zoologiques et des élevages.

Les virus de sous-types **H5** sont hautement pathogènes :
propagation très rapide,
possibilité de mortalité très élevée chez certaines espèces.

Contamination par voie respiratoire ou digestive

- **directe**, contacts rapprochés entre individus :
sécrétions respiratoires, matières fécales,
- **indirecte**, par des matières ou supports contaminées :
nourriture, eau, matériel, plumes, poussières....

De nombreux facteurs peuvent contribuer à la propagation des virus d'influenza aviaire :

- les **migrations**,
- les **élevages intensifs**,
- les **flux de personnes et de matériels** au sein des filières de production ou entre les volailles
d'agrément et les élevages. (source Anses)
-

Le 6 novembre 2025, Alexandre Portmann, directeur du
CSFL (Centre de sauvegarde de la faune lorraine) fait état

RETOUR DE LA GRIPPE AVIAIRE



« d'une forte épidémie touchant les grues cendrées : de 8 000 à 10 000 grues mortes dans la région Grand Est. Rien que sur le Lac du Der : 4 500 oiseaux morts. La particularité de cette espèce, c'est qu'elle reste toujours en groupe : les grues dorment, volent, hibernent, mangent ensemble et se collent les unes aux autres dans les zones humides pour se sécuriser. »



C'est tout ce que H5N1 adore !






AGIR

Que faire si nous trouvons un oiseau malade ?

Virus H5N1



Ne pas le transporter, car s'il est atteint de cette maladie, nous pouvons étendre la zone de contamination.
Prévenir la mairie.

Pour la même raison,
évitons de nous promener au bord des zones humides, mares, étangs, rivières
où les oiseaux migrateurs se reposent.
Nous pouvons propager la maladie en ayant marché dans une fiente d'oiseau contaminé.

Ne ramassons pas de plumes, elles peuvent être contaminées.



Ces mesures sont importantes
pour éviter la contamination des élevages
qui conduit à l'abattage systématique de tous les animaux.
Mesure drastique et terrible pour les éleveurs concernés !!!

Depuis peu, des volailles sont vaccinées préventivement...

Pour l'homme, une transmission est rarissime,
même en mangeant de la volaille ou des œufs.
Elle peut se faire, en l'absence du port d'équipements de protection
individuelle lors de contacts fréquents et/ou prolongés avec des animaux
infectés par le virus, que ceux-ci présentent ou non des symptômes.

Symptômes : comme un rhume ou une grippe.

La transmission interhumaine est rarissime.
À ce jour, aucun cas humain n'a été observé en France.
(source Anses)

