



PETITE BESTIOLE, GRANDS EFFETS !



Où il est à nouveau question de la pyrale du buis...



La feuille de buis n'est déjà pas bien grosse, alors l'œuf ? Environ 1,5 mm.

Une femelle peut en pondre jusqu'à 1 200 pendant les 15 jours de sa vie adulte.



La chenille à l'éclosion.
Taille : 3mm.
Appétit : féroce.

Petite bestiole, grands effets :

paysages modifiés par cet appétit dans la vallée du Rhône sur la commune de Rompon (Ardèche),



automne 2015



automne 2017

dans la commune du Pouzin, ci-dessous (vallée du Rhône entre Valence et Montélimar, côté Ardéchois).

07/09/2015

21/08/2017



Risques futures en plus de la perte du buis :

- **plus grande probabilité d'incendies** avec l'accumulation de bois morts.
- les buis poussant régulièrement dans les falaises ou les zones très pentues, leur disparition risque de provoquer des chutes de pierres et **une plus forte érosion des sols**.






Halte aux invasifs...



Les invasives sont des espèces importées accidentellement ou non, qui trouvent en Europe par exemple des conditions d'autant plus favorables à leur développement que leurs prédateurs n'y sont pas !!!

Ce sont des plantes aussi bien que des animaux.
Voici comment elles arrivent :



En ce qui nous concerne, nous pouvons agir : une fois de plus, faisons attention par exemple à nos achats.



Évitons de faire l'acquisition d'animaux exotiques dont nous pourrions un jour nous lasser...

La charmante petite tortue de Floride (à gauche) relâchée dans la nature par quelques « adoptants » fatigués de changer l'eau de l'aquarium,



ont mis en danger l'espèce indigène européenne, la cistude d'Europe

Avoir un lapin

Vu par les enfants

Vu par les parents



communicationparoissemichel.fr

Partager